

ПОЛИОМИЕЛИТ

памятка

Полиомиелит (детский спинномозговой паралич) – **инфекционное заболевание**, вызываемое **вирусом** полиомиелита.

Чаще всего болеют дети до 5 лет!

Вирус передается:



с пищей



Вирус попадает в организм через рот



с водой



Размножается в лимфоидной ткани кишечника
(инкубационный период от 6 до 21 дня)



при бытовом контакте



Поражает нервную систему

Профилактика:

1. Вакцинация проводится двумя видами вакцин:

- Инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ), содержащая убитый полiovirus, вводится внутримышечно.
- Оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ), содержащая ослабленный живой полiovirus, вводится через рот в виде капель.

Всем детям первого года жизни необходимо сделать три прививки от полиомиелита:

- 3 месяца (ИПВ)
- 4,5 месяца (ИПВ)
- 6 месяцев (ОПВ*)
- Ревакцинацию проводят в 18, 20 месяцев и в 14 лет (ОПВ*)
(*детям из групп риска вакцинацию проводят только ИПВ)

2. Соблюдение правил личной гигиены

- Гигиена рук
- Мытье овощей и фруктов перед употреблением
- Использование чистой питьевой воды